



Aspectos clínicos, laboratoriais e radiográficos de pacientes com tuberculose pulmonar e disglycemia e desfechos do tratamento da tuberculose

André Luiz Bezerra¹, Adriana da Silva Rezende Moreira¹,
Lorrayne Isidoro-Gonçalves², Carla F. dos Santos Lara^{1,3},
Gustavo Amorim⁴, Elisangela C. Silva^{1,5,6,7}, Afrânio Lineu Kritski¹,
Anna Cristina C. Carvalho^{1,2}

Tabela S1. Dados clínicos e laboratoriais dos pacientes (N = 140), distribuídos de acordo com o estado glicêmico no momento do diagnóstico de tuberculose pulmonar.

Variável		Grupo NGTB (n = 54)	Grupo PDMTB (n = 66)	p ^b	Grupo DMTB (n = 20)	p ^c	p ^d
Tosse	Sim	54 (100)	66 (100)	N/A	20 (100)	N/A	N/A
Expectoração	Sim	54 (100)	66 (100)	N/A	20 (100)	N/A	N/A
Escarro com sangue	Não	40 (74,1)	47 (71,2)	0,83	15 (75,0)	1,00	0,84
	Sim	14 (25,9)	19 (28,8)		5 (25,0)		
Hemoptise	Não	45 (83,3)	52 (78,8)	0,64	15 (75,0)	0,50	0,51
	Sim	9 (16,7)	14 (21,2)		5 (25,0)		
Sudorese noturna ^e	Não	10 (18,9)	9 (13,6)	0,46	4 (20,0)	1,00	0,64
	Sim	43 (81,1)	57 (86,4)		16 (80,0)		
Febre	Não	7 (13)	5 (7,6)	0,37	1 (4,8)	0,43	0,24
	Sim	47 (87)	61 (92,4)		20 (95,2)		
Perda de apetite	Não	15 (27,8)	22 (33,3)	0,55	6 (30,0)	1,00	0,57
	Sim	39 (72,2)	44 (66,7)		14 (70,0)		
Dor torácica	Não	13 (24,1)	23 (34,8)	0,23	7 (35,0)	0,38	0,19
	Sim	41 (75,9)	43 (65,2)		13 (65,0)		
Dispneia	Não	20 (37)	27 (36,7)	0,71	6 (30,0)	0,78	1,00
	Sim	34 (63)	39 (59,1)		14 (70,0)		
Cansaço em repouso	Não	15 (44,1)	17 (44,7)	1,00	6 (42,9)	1,00	1,00
	Sim	19 (55,9)	21 (55,3)		8 (57,1)		
Duração da tosse, semanas		7,0 [4,0-15,0]	8,0 [4,0-12,0]	0,95	7,0 [4,0-14,2]	0,97	0,95
Duração da expectoração, semanas		6,0 [4,0-10,0]	6,0 [4,0-11,0]	0,97	6,0 [4,0-14,2]	0,78	0,94
Duração da febre, semanas		4,0 [2,0-6,0]	4,0 [2,0-8,0]	0,50	3,0 [2,0-5,0]	0,72	0,67
Duração da perda de peso, semanas		6,0 [3,0-15,0]	8,0 [5,0-12,0]	0,13	10,0 [4-17,5]	0,17	0,09
Tratamento prévio de tuberculose	Não	47 (87,0)	56 (84,8)	0,79	19 (90,5)	0,43	1,00
	Sim	7 (13,0)	10 (15,2)		1 (5,0)		
HIV ^e	Não	49 (92,5)	61 (92,4)	1,00	19 (95,0)	1,00	1,00
	Sim	4 (7,5)	5 (7,6)		1 (5,0)		

NGTB: normoglicemia [NG; hemoglobina glicada (HbA1c < 5,7%)] + tuberculose (TB); PDMTB: pré-diabetes mellitus (PDM; HbA1c = 5,7-6,4%) + TB; e DMTB: (DM; HbA1c ≥ 6,5%) + TB. ^aValores expressos em forma de n (%) ou mediana [IIQ]. ^bNGTB vs. PDMTB. ^cNGTB vs. DMTB. ^dNGTB vs. PDMTB + DMTB. ^en = 139.